

## 膵臓癌

レジメン	薬剤名	投与量	投与日	1クール
weeklyGEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15	4週間
S-1+GEM	S-1 ゲムシタビン	80-120mg/day 1000mg/m <sup>2</sup>	day1-14 day1.8	3週間
modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン イリノテカン レボホリナート フルオロウラシル(持続静注)	85mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1 day1-3(46時間)	2週間
オニバイド+I-LV+5-FU	イリノテカン リポソーム 製剤※1 レボホリナート フルオロウラシル(持続静注)	70mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup>	day1 day1 day1-3(46時間)	2週間
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン nab-パクリタキセル	1000mg/m <sup>2</sup> 125mg/m <sup>2</sup>	day1.8.15	4週間
膵・消化管神経内分泌腫瘍ストレプトゾシン	ストレプトゾシン	1000mg/m <sup>2</sup>		毎週

※1 UGT1A1 \* 6又は28ホモ接合体 UGT1A1 \* 6及び28ヘテロ接合体 を有する場合、50mg/m<sup>2</sup>で開始し、忍容性が認められれば70mg/m<sup>2</sup>に増量できる